

**GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
QUINQUENNALE DI MATERIALE PER MEDICAZIONE IN FABBISOGNO ALLE
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE BASILICATA**

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

**LOTTO 59
MEDICAZIONE A BASE DI ALGINATO**

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO (g/cmq) | 20 |
| TEMPO DI PERMANENZA MEDIO DELL'APPLICAZIONE | 10 |
| CONFORMABILITA' E FACILITA' DI APPLICAZIONE | 15 |
| FACILITA' DI RIMOZIONE ED ASSENZA DI RESIDUI DOPO LA RIMOZIONE | 15 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 15 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

**LOTTO 60
MEDICAZIONE ELASTICA E ADESIVA IN IDROCOLLOIDE CON FILM DI POLIURETANO**

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO LIQUIDI (g/mq/24h) E INDICATORE DI CAMBIO | 20 |
| FACILITA' DI APPLICAZIONE E RESISTENZA ALLA TRAZIONE | 10 |
| FACILITA' DI RIMOZIONE ED ASSENZA DI RESIDUI DOPO LA RIMOZIONE | 15 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 15 |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE MVTR (g/mq/24h) | 10 |
| PRESENZA DI BORDI SMUSSATI | 5 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

**LOTTO 61
MEDICAZIONE IDROCOLLOIDALE SAGOMATA**

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO LIQUIDI (g/mq/24h) E INDICATORE DI CAMBIO | 20 |
| FACILITA' DI APPLICAZIONE E RESISTENZA ALLA TRAZIONE | 10 |
| FACILITA' DI RIMOZIONE ED ASSENZA DI RESIDUI DOPO LA RIMOZIONE | 15 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 15 |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE MVTR (g/mq/24h) | 10 |
| PRESENZA DI BORDI SMUSSATI | 5 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTO 63
MEDICAZIONE IN GEL IDROFILO

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| PERCENTUALE DI ACQUA | 10 |
| VISCOSITA' INTESA COME CONSISTENZA DEL GEL | 20 |
| CAPACITA' D'IDRATAZIONE | 10 |
| ASSENZA DI RESIDUO OVVERO COMPLETA UTILIZZAZIONE DEL PRODOTTO | 15 |
| FACILITA' DI UTILIZZO DOVUTA ALLE CARATTERISTICHE DELL'APPLICATORE | 10 |
| LETTERATURA A SUPPORTO DELL'EFFICACIA E ASSENZA DI TOSSICITA' | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTO 64
MEDICAZIONE PER FERITE CAVITARIE

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO (g/cmq) | 20 |
| MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' DI APPLICAZIONE | 10 |
| CONFORMABILITA' AL LETTO DELLA LESIONE | 25 |
| FACILITA' DI RIMOZIONE ED ASSENZA DI RESIDUI DOPO LA RIMOZIONE | 5 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 15 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTO 65
MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO NON ADESIVA

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO (g/cmq) | 20 |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE MVTR (24h g/mq) | 10 |
| CONFORMABILITA' AL LETTO DELLA LESIONE | 20 |
| FACILITA' DI RIMOZIONE ED ASSENZA DI RESIDUI DOPO LA RIMOZIONE | 5 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| MODALITÀ DI ASSORBIMENTO (PREFERIBILMENTE VERTICALE PER EVITARE LA MACERAZIONE PERILESIONALE) | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTO 66**MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA NON ADESIVA PER TRACHEOSTOMIA**

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO (g/cm ²) | 20 |
| CONFORMABILITA' | 10 |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE MVTR (24h g/m ²) | 10 |
| STABILITA' DELLA MEDICAZIONE IN SITU (CAPACITA' DI MANTENERE LA POSIZIONE SENZA DISTACCHI ACCIDENTALI) | 20 |
| FACILITA' DI RIMOZIONE ED ASSENZA DI RESIDUI DOPO LA RIMOZIONE | 5 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTO 67**MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON BORDI ADESIVI**

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO (g/cm ²) | 20 |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE MVTR (24h g/m ²) | 10 |
| CONFORMABILITA' AL LETTO DELLA LESIONE | 15 |
| FACILITA' DI RIMOZIONE ED ASSENZA DI RESIDUI DOPO LA RIMOZIONE | 5 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| ASSENZA DI COLLANTI SULLA CUTE DOPO LA RIMOZIONE | 5 |
| MODALITÀ DI ASSORBIMENTO (PREFERIBILMENTE VERTICALE PER EVITARE LA MACERAZIONE PERILESIONALE) | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTO 68**MEDICAZIONE PER FERITE ESSUDATIVE**

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO (g/cm ²) | 20 |
| MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' DI APPLICAZIONE E CONFORMABILITA' | 20 |
| FACILITA' DI RIMOZIONE ED ASSENZA DI RESIDUI DOPO LA RIMOZIONE | 10 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 15 |
| TEMPO DI PERMANENZA IN SITU | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTI 69 e 70
DISPOSITIVO ANTIDECUBITO: per ferite del tallone e della zona sacrale

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| CONFORMABILITA' AL LETTO DI LESIONE | 20 |
| STABILITA' DELLA MEDICAZIONE IN SITU (CAPACITA' DI MANTENERE LA POSIZIONE SENZA DISTACCHI ACCIDENTALI) | 20 |
| MANEGGEVOLEZZA, FACILITA' DI APPLICAZIONE, FACILITA' DI RIMOZIONE ED ASSENZA DI RESIDUI DOPO LA RIMOZIONE | 10 |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE MVTR (24h g/mq) | 10 |
| MISURA REALE DELLA MEDICAZIONE | 10 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 5 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTO 71
MEDICAZIONE A BASE DI FIBRE DI CELLULOSA GELIFICANTI

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO (g/cmq) | 20 |
| PERCENTUALE DI FIBRE IN CELLULOSA O CARBOSSIMETILCELLULOSA | 20 |
| MINIMO RESTRINGIMENTO | 15 |
| FACILITA' DI RIMOZIONE, ASSENZA DI RESIDUI DOPO LA RIMOZIONE E CONFORMABILITA' | 10 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTO 72
MEDICAZIONE A BASE DI FIBRE DI esteri di CELLULOSA GELIFICANTI con argento

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO (g/cmq) | 20 |
| PERCENTUALE DI ARGENTO mg/cmq | 20 |
| CAPACITA' DI RILASCIO DELL'ARGENTO | 10 |
| CAPACITA' ANTISETTICA DIMOSTRATA CON PUBBLICAZIONI | 10 |
| FACILITA' DI RIMOZIONE, ASSENZA DI RESIDUI DOPO LA RIMOZIONE E CONFORMABILITA' | 10 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 5 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTO 73**MEDICAZIONE PER FERITE INFETTE: medicazione in carbone attivo con argento per ferite infette a largo spettro antimicrobico**

| | punti max 80 |
|--|-----------------|
| ATTIVITA' ANTIMICROBICA DIMOSTRATA DA STUDI CONDOTTI SUL PRODOTTO E PUBBLICATI SU RIVISTE SCIENTIFICHE | 20 |
| QUANTITA' DI ARGENTO E CARBONE ATTIVO | 15 |
| CAPACITA' DI GESTIRE L'ODORE | 10 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO ALLA SATURAZIONE DELLA MEDICAZIONE G/MQ NELLE 24 E 72 ORE | 10 |
| FACILITA' DI APPLICAZIONE E CONFORMABILITA' | 10 |
| TEMPO DI PERMANENZA IN GIORNI | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTO 74**Medicazione costituita da cellulosa ossidata rigenerata e collagene liofilizzati o materialiequivalenti**

| | punti max 80 |
|--|-----------------|
| TEMPO MEDIO DI GUARIGIONE DELLA FERITA | 20 |
| TEMPO DI TRASFORMAZIONE IN GEL | 20 |
| TEMPISTICA DI BIOASSORBIBILITA' | 20 |
| LETTERATURA A SUPPORTO DELL'EFFICACIA E ASSENZA DI TOSSICITA' | 15 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTO 76**Medicazione costituita da cellulosa ossidata rigenerata e collagene o materiali equivalenti con argento**

| | punti max 80 |
|--|-----------------|
| TEMPO MEDIO DI GUARIGIONE DELLA FERITA | 20 |
| TEMPO DI TRASFORMAZIONE IN GEL | 15 |
| TEMPISTICA DI BIOASSORBIBILITA' | 20 |
| ATTIVITA' ANTIMICROBICA DIMOSTRATA DA STUDI CONDOTTI SUL PRODOTTO E PUBBLICATI SU RIVISTE SCIENTIFICHE | 10 |
| LETTERATURA A SUPPORTO DELL'EFFICACIA E ASSENZA DI TOSSICITA' | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTO 78
MEDICAZIONE DI CONTATTO, PROTETTIVA, TRASPARENTE IN RETE DI
POLIURETANO, POLIESTERE, POLIAMMIDE O MATERIALE EQUIVALENTE E SILICONE
MORBIDO

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| MANEGGEVOLEZZA NELLA MODALITA' DI APPLICAZIONE | 20 |
| GRADO DI TENUTA | 20 |
| IMPERMEABILITA' ALL'ACQUA, TRASPIRABILITA' DELLA CUTE | 15 |
| | |
| ATRAUMATICITA' ALLA RIMOZIONE | 10 |
| CERTIFICAZIONE E/O DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA QUALITA' | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTO 79
MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO, PER IL DRENAGGIO DEGLI ESSUDATI

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| ATTIVITA' ANTIMICROBICA DIMOSTRATA DA STUDI CONDOTTI SUL PRODOTTO E PUBBLICATI SU RIVISTE SCIENTIFICHE | 20 |
| QUANTITA' DI ARGENTO E CARBONE ATTIVO | 15 |
| CAPACITA' DI GESTIRE L'ODORE | 10 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO ALLA SATURAZIONE DELLA MEDICAZIONE G/MQ NELLE 24 E 72 ORE | 10 |
| FACILITA' DI APPLICAZIONE E CONFORMABILITA' | 10 |
| TEMPO DI PERMANENZA IN GIORNI | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE POST-VENDITA | 5 |

LOTTO 80
SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA con medicazione in garza e poliuretano

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| MINORE INGOMBRO E RUMOROSITA', DIMENSIONE E PESO DELL'APPARECCHIATURA | 20 |
| RANGE DI PRESSIONE DI ESERCIZIO | 15 |
| GAMMA DELLE MISURE DELLE MEDICAZIONI, CONFORMABILITA' ALLA FERITA | 10 |
| FUNZIONI RILEVABILI DAL DISPLAY, QUANTITA' E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI ALLARMI, CONNETTIVITA' DA REMOTO | 10 |
| PRESENZA DI FILTRI ANTIBATTERICI E SIGILLATURA DEI CONTENITORI DI RACCOLTA DEI FLUIDI, FACILITA' DI SOSTITUZIONE DEL CONTENITORE DI RACCOLTA FLUIDI E CAPACITA' DEL CONTENITORE DI RACCOLTA FLUIDI | 15 |
| CONNESSIONE DEI TUI DI DRENAGGIO CON CHIUSURA DI SICUREZZA, SISTEMA ANTIOCCCLUSIONE | 5 |
| ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE POST-VENDITA, RAPIDITA' DEI TEMPI DI CONSEGNA | 5 |

LOTTE 81 e 82**SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA con medicazione in garza e poliuretano 7-10 gg e 14-15 gg**

| | punti max 80 |
|---|-----------------|
| DIMENSIONI DELLA POMPA ED AUTONOMIA DI CARICA | 20 |
| PRESENZE DI SPIE LUMINOSE INDICANTI IL FUNZIONAMENTO O IL MAL FUNZIONAMENTO, LA PERDITA D'ARIA, CONSUMO BATTERIE, e cambio della medicazione) | 20 |
| GAMMA DELLE MISURE e formati (MEDICAZIONI SAGOMATE PER ZONE DIFFICILI) | 20 |
| TUBO DI CONNESSIONE ANTIDECUBITO E ANTIOSTRUZIONE | 10 |
| ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE POST-VENDITA, RAPIDITA' DEI TEMPI DI CONSEGNA | 10 |

LOTTO 83**SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA senza raccoglitore di fluidi**

| | punti max 80 |
|---|-----------------|
| DIMENSIONI DELLA POMPA ED AUTONOMIA DI CARICA | 20 |
| PRESENZE DI SPIE LUMINOSE INDICANTI IL FUNZIONAMENTO O IL MAL FUNZIONAMENTO, LA PERDITA D'ARIA, CONSUMO BATTERIE, ECC.) | 20 |
| GAMMA DELLE MISURE DELLE MEDICAZIONI | 20 |
| TUBO DI CONNESSIONE ANTIDECUBITO E ANTIOSTRUZIONE | 10 |
| ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE POST-VENDITA, RAPIDITA' DEI TEMPI DI CONSEGNA | 10 |

LOTTO 84**SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE AD ADDOME APERTO**

| | punti max 80 |
|--|-----------------|
| VALORI DI PRESSIONE APPLICATA DISPONIBILI | 20 |
| SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE | 20 |
| PRESENZA E TIPOLOGIA DEL DISPLAY, TIPOLOGIA E GESTIONE DEGLI ALLARMI | 10 |
| NUMERO, TIPOLOGIE E CALIBRI DI DRENAGGI DISPONIBILI | 10 |
| PORTABILITA' E COMFORT PER IL PAZIENTE | 10 |
| ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE POST-VENDITA, RAPIDITA' DEI TEMPI DI CONSEGNA | 10 |

LOTTO 85
SISTEMA TERAPEUTICA A PRESSIONE NEGATIVA con instillazione di fluidi

| | punti max 80 |
|--|-----------------|
| MINORE INGOMBRO E RUMOROSITA', DIMENSIONE E PESO DELL'APPARECCHIATURA | 20 |
| RANGE DI PRESSIONE DI ESERCIZIO | 20 |
| GAMMA DELLE MISURE DELLE MEDICAZIONI, CONFORMABILITA' ALLA FERITA | 10 |
| FUNZIONI RILEVABILI DAL DISPLAY, QUANTITA' E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI ALLARMI, CONNETTIVITA' DA REMOTO | 10 |
| PRESENZA DI FILTRI ANTIBATTERICI E SIGILLATURA DEI CONTENITORI DI RACCOLTA DEI FLUIDI, FACILITA' DI SOSTITUZIONE DEL CONTENITORE DI RACCOLTA FLUIDI E CAPACITA' DEL CONTENITORE DI RACCOLTA FLUIDI | 10 |
| CONNESSIONE DEI TUI DI DRENAGGIO CON CHIUSURA DI SICUREZZA, SISTEMA ANTIOCCCLUSIONE | 5 |
| ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE POST-VENDITA, RAPIDITA' DEI TEMPI DI CONSEGNA | 5 |

LOTTO 86
GEL EMOSTATICO COMPLETAMENTE RIASSORBIBILE

| | punti max 80 |
|---|-----------------|
| CONCENTRAZIONE DI TROMBINA E GRANULI DI COLLAGENE | 20 |
| CAPACITA' DI DISTRIBUZIONE SU SEDI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE | 20 |
| TEMPO NECESSARIO PER L'EMOSTASI | 10 |
| UTILIZZO IN DIVERSE BRANCHE CHIRURGICHE | 10 |
| LETTERATURA A SUPPORTO DELL'EFFICACIA E ASSENZA DI TOSSICITA' | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 10 |

LOTTO 116
MEDICAZIONE PRIMARIA

| | punti max 80 |
|---|-----------------|
| AMPIO SPETTRO D'AZIONE (stafilococco aureo e pseudomonas aeruginosa) | 30 |
| MINIMIZZAZIONE EFFETTO LESIVO SUI PROCESSI METABOLICI E PROLIFERATIVI DELLE CELLULE | 30 |
| RIDUZIONE ESITI CICATRIZIALI | 20 |

LOTTO 117
FILM BARRIERA AD ELEVATA PROTEZIONE

| | punti max 80 |
|--|-----------------|
| PERMANENZA DEL FILM IN SITU | 30 |
| EFFICACIA SU CUTE BAGNATA E/O ASCIUTTA | 20 |
| RESISTENZA ALL'ATTRITO DA SFREGAMENTO | 20 |
| FACILITA' APPLICAZIONE | 10 |

**LOTTO 118
PROTETTIVO LIQUIDO**

| | punti max |
|---------------------------------------|-----------|
| | 80 |
| APPLICAZIONE SU CUTE LESA | 30 |
| ADATTAMENTO AI MOVIMENTI DELLA CUTE | 30 |
| RESISTENZA ALL'ATTRITO DA SFREGAMENTO | 20 |

**LOTTO 119
BARRIERA IN POLIAMMIDE**

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| PROPRIETA' ANTIBATTERICHE AMPIE (EFFICACIA SU GRAM+ E GRAM - E BATTERI RESISTENTI) | 30 |
| PRESENZA DI SOSTANZE NATURALI CHE RENDONO ATRAUMATICA LA RIMOZIONE DAL SITU (NO ADDITIVI QUALI VASELLINA ETC...) | 30 |
| MORBIDEZZA E MODELLABILITA' | 10 |
| EFFICACIA ALMENO FINO A 7 GIORNI | 10 |

**LOTTO 120
MEDICAZIONE SUPERASSORBENTE**

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| MORBIDEZZA STRATO A CONTATTO CON LA FERITA (PREFERIB. SILICONE) | 30 |
| AMPIA AREA ASSORBENTE | 30 |
| POSSIBILITA' DI ESSERE LASCIATA IN SITU FINO A 5 GIORNI | 10 |
| ATRAUMATICITA' RIMOZIONE CON PRESERVAZIONE BORDI LESIONALI | 10 |

**LOTTO 121
MEDICAZIONE SUPERASSORBENTE**

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| MORBIDEZZA STRATO A CONTATTO CON LA FERITA (PREFERIB. SILICONE) | 30 |
| AMPIA AREA ASSORBENTE | 30 |
| POSSIBILITA' DI ESSERE LASCIATA IN SITU FINO A 5 GIORNI | 10 |
| ATRAUMATICITA' RIMOZIONE CON PRESERVAZIONE BORDI LESIONALI | 10 |

**LOTTO 122
MEDICAZIONE PLURISTRATIFICATA**

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| VERSIONE CAVITARIA PRIVA DELLO STRATO ESTERNO IDROFOBICO | 30 |
| VELOCITA' PROCESSO DI RIPARAZIONE PER ATTIVITA' DETERSIONE | 30 |
| POSSIBILITA' DI ESSERE LASCIATA IN SITU FINO 72 ORE | 10 |
| ATRAUMATICITA' RIMOZIONE | 10 |

LOTTO 123
MEDICAZIONE PLURISTRATIFICATA IN SCHIUMA

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| PERMEABILITA' AL VAPORE | 30 |
| CAPACITA' DI FORNIRE IL GIUSTO GRADO DI UMIDITA' | 30 |
| CONFORMABILITA' SU ZONE DIFFICILI | 10 |
| ATRAUMATICITA' RIMOZIONE | 10 |

LOTTO 126
MEDICAZIONE PLURISTRATIFICATA IN SCHIUMA

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| POSSIBILITA' DI PENETRAZIONE NEL LETTO DELLA LESIONE FINO A 2 CM | 30 |
| STRATO A CONTATTO CON LA CUTE PREFERIBILMENTE IN SILICONE | 30 |
| CONFORMABILITA' SU ZONE DIFFICILI | 10 |
| ATRAUMATICITA' RIMOZIONE | 10 |

LOTTO 127
MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO (g/cm ²) | 15 |
| PERCENTUALE DI FIBRE IN CELLULOSA O CARBOSSIMETILCELLULOSA SALDATE A CELLE ESAGONALI | 20 |
| MINIMO RESTRINGIMENTO | 15 |
| FACILITA' DI RIMOZIONE, ASSENZA DI RESIDUI DOPO LA RIMOZIONE E CONFORMABILITA' | 15 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 5 |

LOTTO 128
MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON ARGENTO

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO (g/cm ²) preferibilmente verticale | 15 |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE MVTR (24h g/m ²) | 10 |
| CONFORMABILITA' AL LETTO DELLA LESIONE FINO A 2 cm | 20 |
| CAPACITA' DI RILASCIO IONI ARGENTO | 20 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 5 |

LOTTO 129
MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO A STRUTTURA 3D

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO (g/cmq) | 20 |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE MVTR (24h g/mq) | 10 |
| CONFORMABILITÀ AL LETTO DELLA LESIONE FINO A 2 cm | 20 |
| MODALITÀ DI ASSORBIMENTO (PREFERIBILMENTE VERTICALE PER EVITARE LA MACERAZIONE PERILESIONALE) | 10 |
| ASSENZA DI COLLANTI SULLA CUTE DOPO LA RIMOZIONE | 5 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITÀ A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 5 |

LOTTO 130
MEDICAZIONE IN TRAMA DI POLIESTERE CON Ag

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| CONTENUTO DI Ag 1,2 mg/cmq | 20 |
| COMPONENTE LIPIDICA >80% | 20 |
| COMPONENTE COLLOIDALE > 12% | 20 |
| TEMPO DI PERMANENZA IN SITU | 5 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITÀ A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 5 |

LOTTO 131
Soluzione antibatterica

| | punti max |
|--|-----------|
| | 80 |
| CONTENUTO DI POLIESANIDE E BETAINA | 20 |
| CAPACITÀ DI RIMUOVERE IL BIOFILM BATTERICO | 20 |
| CAPACITÀ DI ACCELERARE I TEMPI DI GUARIGIONE | 15 |
| LIVELLO DI TOLLERABILITÀ NEL TEMPO | 10 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITÀ A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 5 |

LOTTO 132
Gel acquoso antibatterico

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| CONTENUTO DI POLIESANIDE E BETAINA | 20 |
| CAPACITA' DI RIMUOVERE IL BIOFILM BATTERICO | 20 |
| CAPACITA' DI ACCELERARE I TEMPI DI GUARIGIONE | 15 |
| LIVELLO DI TOLLERABILITA' NEL TEMPO | 10 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 5 |

LOTTO 133
UNGUENTO a base di Acido Ialuronico e Collagenasi

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| CONTENUTO DI ACIDO IALURONICO 0,2% | 20 |
| CONTENUTO DI COLLAGENASI NON INFERIORE A 2,0nkat/g | 20 |
| CAPACITA' DI IDRATAZIONE TISSUTALE | 20 |
| TEMPO DI PERMANENZA IN SITU | 5 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 5 |

LOTTO 134
MEDICAZIONE BIOATTIVA con Collagene e A.Ialuronico

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' EMOSTATICA | 20 |
| CONTENUTO DI COLLAGENE EQUINO ETEROLOGO NATIVO DI TIPO I | 20 |
| CAPACITA' DI IDRATAZIONE TISSUTALE | 20 |
| TEMPO DI PERMANENZA IN SITU | 5 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 5 |

LOTTO 136
Medicazione in pasta antimicrobica

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| CONFORMABILITA' | 20 |
| CAPACITA' DI RIMOZIONE ESSUDATO E FIBRINA | 20 |
| RIDUZIONE CARICA BATTERICA | 20 |
| TEMPO DI PERMANENZA IN SITU | 5 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 5 |

LOTTO 138**Medicazione di captazione batterica assorbente idroattiva**

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO | 20 |
| CAPACITA' DI RIMOZIONE ESSUDATO | 20 |
| RIDUZIONE CARICA BATTERICA | 20 |
| TEMPO DI PERMANENZA IN SITU | 5 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 5 |

LOTTO 139**Medicazione super-assorbente**

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO >100gr/cmq | 20 |
| CAPACITA' DI RITENZIONE DEI FLUIDI >100gr/cmq | 20 |
| CONFORMABILITA' | 20 |
| TEMPO DI PERMANENZA IN SITU | 5 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 5 |

LOTTO 147**MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI**

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO TRASFERIMENTO DELL'ESSUDATO ALLA MEDICAZIONE SECONDARIA | 30 |
| CAPACITA' DI RIMANERE INTATTA PER FACILITARNE LA RIMOZIONE | 20 |
| POSSIBILITA' DI UTILIZZO IN FERITE CAVITARIE | 20 |
| | 10 |

LOTTO 150**EMOSTATICO LOCALE**

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| TEMPO DI EMOSTASI INFERIORE A 2 MIN. | 20 |
| TEMPO DI BIODEGRADAZIONE MAX 8 GIORNI | 20 |
| TEMPI DI RIASSORBIMENTO MAX 72 ORE | 20 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 10 |

**LOTTO 151
EMOSTATICO LOCALE**

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| TEMPO DI EMOSTASI | 30 |
| TECNOLOGIA CHE PERMETTE UNA MASSIMA ADESIONE AL SITO DI APPLICAZIONE | 30 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 10 |

**LOTTO 152
EMOSTATICO ATTIVO**

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| RIASSORBIBILE COMPLETAMENTE IN MAX 90 GG | 30 |
| POSSIBILITA' DI SCELTA TRA DIVERSE FORMULAZIONI | 30 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 10 |

**LOTTO 167
POLVERE EMOSTATICA IN GRANULI A BASE DI POLISACCARIDI**

| | punti max |
|---|-----------|
| | 80 |
| TEMPO DI EMOSTASI | 20 |
| CAPACITA' DI ASSORBENZA DEI LIQUIDI | 20 |
| TEMPI DI RIASSORBIMENTO | 20 |
| LETTERATURA SCIENTIFICA A SOSTEGNO DELL'EFFICACIA | 10 |
| DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRODOTTI SCADUTI – ASSISTENZA E FORMAZIONE POST VENDITA | 10 |